

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОГЛАСОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Приказ Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь
 от «26» 12 2012 № 1515

Копия от 04.12.12

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

**РЕОГЕМИН
 (REOGEMIN)**

Регистрационный номер

Торговое название лекарственного средства: Реогемин

Лекарственная форма: раствор для инфузий

Общая характеристика.

Описание: прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость

Состав:	на 400 мл	на 200 мл
Активное вещество		
Натрия сукцината (в виде натрия сукцината 6-водного)	3,0 г	1,5 г
Вспомогательные вещества:		
Натрия хлорида	1,6 г	0,8 г
Калия дигидрофосфата	0,56 г	0,28 г
Магния хлористого (в виде магния хлористого 6-водного)	0,04 г	0,02 г
Глюкозы (в виде глюкозы моногидрата или безводной)	2,0 г	1,0
Воды для инъекций	до 400 мл	до 200 мл

Ионный состав: Na^+ – 161 ммоль/л, K^+ – 10,2 ммоль/л, Mg^{++} – 1,1 ммоль/л, Cl^- – 70,5 ммоль/л, фосфаты (в пересчете на фосфор) – 10,0 ммоль/л.

Теоретическая осмоляльность 310 мОсмоль/кг.

pH раствора: 5,5-7,0.

Фармакотерапевтическая группа: Плазмозамещающие и перфузионные растворы. Растворы, влияющие на электролитный баланс.

Код АТХ: B05BB

Фармакологические свойства.

Реогемин обладает антигипоксическим и антиоксидантным действием, оказывает положительный эффект на аэробные процессы в клетке, уменьшая продукцию свободных радикалов и восстанавливая энергетический потенциал клеток.

Фармакодинамика

Реогемин активирует ферментативные процессы цикла Кребса и способствует утилизации жирных кислот и глюкозы клетками; нормализует кислотно-щелочной баланс и газовый состав крови, оказывает позитивное влияние на функциональную активность системы антиоксидантной защиты клеток. Обладает умеренным диуретическим действием.

Фармакокинетика.

При внутривенном введении реогемин быстро утилизируется и не накапливается в организме.

Показания к применению

Реогемин применяют в качестве антигипоксического и дезинтоксикационного средства при острых эндогенных и экзогенных интоксикациях различной этиологии.

Способ применения и дозы

Для лиц старше 18 лет и взрослым: Реогемин вводят внутривенно капельно со скоростью до 90 капель в минуту (1-4,5 мл в минуту) в дозе 400-800 мл/сутки.

Скорость введения и дозировку определяют в соответствии со степенью тяжести заболевания.

Общий курс терапии – до 11 суток.

Побочное действие

При быстром введении лекарственного средства возможны кратковременные реакции в виде чувства жара и покраснения верхней части тела.

Противопоказания

- индивидуальная непереносимость;
- состояние после черепно-мозговой травмы, сопровождающееся отеком головного мозга;
- выраженные нарушения функции почек;
- беременность, лактация.
- дети до 18 лет.


Передозировка

Случаев передозировки на настоящий момент не выявлено.

Меры предосторожности

С осторожностью применять при:

- алкалозе;
- сахарном диабете.



Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Хорошо сочетается с антибиотиками, водорастворимыми витаминами.

Форма выпуска

В стеклянных бутылках 400 мл в упаковке № 1, № 12, № 24 или в стеклянных бутылках 200 мл в упаковке № 1, № 20, № 40 с соответствующим количеством инструкций по применению.

Бутылку 200 мл или 400 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. Пачки помещают в ящики картонные с перегородками или решетками из картона гофрированного.

Для стационаров 20 или 40 бутылок по 200 мл, 12 или 24 бутылки по 400 мл вместе с 1-2 инструкциями по применению помещают в ящики картонные с перегородками или решетками из картона гофрированного.

Условия хранения

При температуре не выше +25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Лекарственное средство нельзя использовать после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска

Для стационаров. В упаковках № 12, № 20, № 24 и № 40.

Для розничной торговли. В упаковке № 1, по рецепту.

Информация о производителе

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь.

222603, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1, Минская область.

Тел./факс +375 (1770) 62001/62073.